

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

La termoestabilitat del medicament és la resistència a la deterioració d'aquest per les variacions en la temperatura. . La Real Farmacopea Española estableix que quan l'acondiciament extern d'un medicament indica la necessitat de conservar-lo en nevera es refereix a conservar-lo a una temperatura de 2-8°C. Mantenir la cadena de fred és de vital importància per a evitar que els medicaments perdin efectivitat i per tant puguin ocasionar perjudicis als pacients als quals se'ls subministra aquesta medicació.

1. Objectiu

Descriure la sistemàtica de control i registre de la temperatura dels frigorífics destinats al magatzematge de medicaments termolàbils, per a mantenir els valors del mateix entre 2 °C i 8 °C.

2. Àmbit d'aplicació

Aquest procediment és d'obligat compliment per tots els professionals de l'àrea de crítics i s'aplica a les neveres A1, B1, C1, F1 i G1, situades en les diferents unitats de l'àrea.

3. Recursos necessaris

- Termòmetre específic de control de temperatura de frigorífics.
- Manual d'ús del termòmetre utilitzat en la unitat. Veure Annexo 1 d'Instruccions de Maneig dels termòmetres models: INDOOR-30.1011.
- Imprès de registre de control de temperatura. Veure Annex 2 d'Imprès de Registre de Control de Temperatura.
- Llistat de medicaments termolàbils d'ús freqüent. Veure Annex 3 Llistat de Medicaments Termolàbils. Informació sobre estabilitat fora de nevera. (HUB – Servei de Farmàcia).

4. Descripció del procediment

La medicació termolàbil en ser sensible als canvis de temperatura, ha de ser emmagatzemada en un frigorífic destacat **únicament** per a magatzematge i manteniment exclusiu d'aquesta medicació.

Per a assegurar el correcte funcionament del frigorífic, és imprescindible que l'aparell reuneixi una sèrie de requisits:

- a) Estar situat allunyat de tota font de calor (radiadors, estufes...).
- b) Respectar una sèrie de recomanacions que resulten fonamentals:
 - 1) El frigorífic ha d'estar situat a uns 15 cm. de distància a la paret, per a permetre que la calor es dispersi.
 - 2) Ha d'estar connectat a la xarxa general, amb presa de terra, no a

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

derivacions, per a evitar desconnexions accidentals.

- 3) El frigorífic HA DE ROMANDRE SEMPRE TANCAT i per a això la porta haurà d'obrir-se solament les vegades imprescindibles i procedint a tancar-la al més aviat possible.
- 4) A l'interior del frigorífic no s'ha d'ocupar més de la meitat de l'espai disponible i han de deixar-se espais buits entre els envasos, per a permetre la circulació de fred.
- 5) Els medicaments no han de contactar amb les parets del frigorífic per la possibilitat de congelació (uns 4 cm. mínims de la paret).
- 6) El frigorífic MAI ha de contenir cap productes aliens als propis de la farmàcia i nutrició dels pacients.
- 7) Les instruccions de maneig (Annexos 1) estaran incorporades al frigorífic de la Unitat en un lloc visible juntament amb l'imprès de registre diari.

Passos a seguir:

- 1) El mesurament de la tempera del frigorífic es realitzarà diàriament una vegada per torn sent les hores indicades per al mesurament 8,15, 22h. Anotant-se la temperatura actual del interior de la nevera, i la màxima i mínima des de l'últim control realitzat.
- 2) De les dades obtingudes es deixarà constància en el registre que existeix per a això. Les anotacions diàries es reflectissin clarament en l'imprès de registre de temperatura emplenant tots els seus apartats.
- 3) Una vegada finalitzada el mesurament i registrats les dades obtingudes, en el termòmetre ha de realitzar-se "reset" o esborrament d'aquestes dades. Veure Annexos 1.
- 4) El Pyxis nevera conté un registrador de temperatura "AKO", on es monitoritza la temperatura interna de la pròpia nevera. Es notifiquen les temperatures fora de rang (severitat mitja o alta) al Servei de Farmàcia mitjançant avisos als correus electrònics genèrics farmacia@bellvitgehospital.cat i sadmesfarmacia@bellvitgehopsital.cat, corresponents torns de tècnics de dia i de nit, respectivament. El registre de la incidència de la temperatura fora de rang es gestiona a través de l'aplicatiu <https://akonet.cloud/no-device-company>, en el qual hi tenen accés 4 farmacèutics referents de Pyxis, la supervisora i els tècnics del Serveis de Farmàcia. En cas de desviació de temperatura el tècnic referent es posarà en contacte amb supervisió del servei associat a la incidència.
- 5) En cas de desviació de la temperatura, el *Servei de Farmàcia del HUB* recomana:
 - a) Si alguna temperatura supera els 8°C ens podem trobar amb dos escenaris:

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

- i. Si la temperatura ha estat entre 8º-12º durant un període < 8 hores no cal prendre cap mesura, informar supervisió i registrar la incidència en observacions del full de registre.
 - ii. Si la temperatura de la nevera ha sigut > 12ºC o ha estat entre 8-12ºC > 8 hores s'iniciarà el protocol d'actuació en cas de trencament de la cadena del fred.
- b) Actuacions en cas de trencament de la cadena del fred:
- i. Informar supervisió.
 - ii. Informar el servei de farmàcia (Ext: 2029) ja que serà necessari que apliquin el protocol de trencament de cadena del fred en medicaments termolàbils.
 - iii. Recopilar dades de la incidència: temperatura en la que s'ha arribat i el temps de desviació.
 - iv. Passarem al servei de farmàcia un llistat dels medicaments afectats.
 - v. Els immobilitzarem a l'espera que el servei de farmàcia ens digui com procedir amb ells.
 - vi. Comprovar la causa determinant (porta oberta o mal ajust d'aquesta, presència de neu en el congelador, mala col·locació de la sonda, mal ajust del termòstat...), intentant solucionar el fet amb la finalitat de recuperar la temperatura i mantenir el rang adequat.
 - vii. Si es tracta d'una avaria, realitzar part d'avaria al servei de manteniment.

5. . Recursos necessaris

- Frigorífic.
- Termòmetre.

6. Documents relacionats

1. Servei de Farmàcia, Hospital Universitari de Bellvitge. (2024). ESTABILITAT MEDICAMENTS TERMOLÀBILS.
2. Pol Clèries Rovira. Mónica Estopiñá Antolí. Concepción Faz Mendez. Miriam Muñoz Bolaño. Ariadna Padullés Zamora. Clara Ribera Puig. (2023). PROTOCOL D'ÚS SEGUR DEL MEDICAMENT de l'Hospital Universitari de Bellvitge.
3. Castellano-Zurera MM, Núñez-García D, Carrasco-Peralta JA, Torres-Olivera A. Puntos críticos en la conservación y caducidad de medicamentos. Mejoras implantadas por unidades clínicas en procesos de acreditación. Rev Calid Asist [Internet]. 2011;26(4):228–33. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1134282X11000236>.
4. Cabañas MJ, Queralt Gorgas M. El servicio de farmacia frente a la logística de dispensación, almacenamiento y conservación segura de medicamentos en unidades asistenciales. Farm

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Hosp [Internet]. 2020 [citado el 19 de noviembre de 2024];44(7):53–6. Disponible en: <https://ddd.uab.cat/record/244140>.

5. Periañez Parraga L, Gómez-Lobón A, Gamón Runnenberg I, Seco Melantuche R, Delgado Sánchez O, Puigventós Latorre F. Medicamentos termolábiles. Protocolo de actuación en la rotura de la cadena de frío. Farm Hosp [Internet]. 2011;35(4):190.e1-190.e28. Disponible en: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1130634311000390>.

7. Elaborat per

Pedro M. Fernández Rodríguez, Infermer Gestor de RPQ/REA (HUB)

8. Validat per

Rafael Justel Garcia. Cap d'Àrea del Malalt Crític (HUB).

9. Assessors/col·laboradors

Clara Ribera Puig. Farmacèutica especialista (HUB)

Ariadna Padulles Zamora. Farmacèutica especialista (HUB)

10. Pròxima actualització / revisió

Any 2028

11. Aprovat per

Qualitat i Seguretat Clínica

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

12. Annex 1:

INSTRUCCIONS DE MANEIG DEL TERMÒMETRE MODEL INDOOR- 301011/5819



Termòmetre mediambiental amb:

- Pantalla dividida en dos espais que facilita informació de les temperatures interior i exterior.
- Cable (sonda sensora de temperatura).
- Botó 1: Max/Min, permet visualitzar en pantalla la temperatura màxima i mínima.
- Botó 2: Reset (esborrar), es coneix com la posada en condicions inicials d'un sistema.

IN / OUT:

En tractar-se d'un termòmetre mediambiental, el termòmetre ens dona en pantalla la temperatura "IN" com la interior de l'edifici on aquesta col·locat i "OUT" com la temperatura exterior de l'edifici (captada per la sonda que traurem fora de l'habitació on es trobés el termòmetre).

En usar aquest termòmetre per a mesurar la temperatura del frigorífic (la sonda es col·loca dins del frigorífic), ens trobem que els termes "IN" (temperatura exterior) i "OUT" (temperatura interior) corresponen al següent:

- "OUT" (temperatura marcada per la sonda) correspon a l'interior del frigorífic.
- "IN", marca la temperatura del mitjà exterior, és a dir, en aquest cas la temperatura de l'habitació.

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

PROCEDIMENT DE MESURAMENT

En iniciar el control de temperatura, el primer que ens trobem en la pantalla del termòmetre, **és la temperatura del moment actual** (part superior “**IN**” temperatura mediambiental), (part inferior “**OUT**” temperatura interior del frigorífic).

Per a **conèixer la temperatura màxima i mínima** des de l'última vegada que es va realitzar el mesurament realitzar els següents passos:

1. Prement 1 vegada el botó 1 (**MAX/MIN**), apareix en pantalla la temperatura màxima i mínima mediambiental.
2. Prement una altra vegada el botó 1 (**MAX/MIN**), apareix en pantalla la temperatura màxima i mínima interior del frigorífic.

Anotarem els valors del mesurament realitzat

Prement el botó 2, **RESET**, eliminem la xifra de temperatura anterior acumulada en el termòmetre. Esperem uns segons i apareixerà en pantalla la temperatura (“**IN**” mediambiental) i (“**OUT**” interior del frigorífic) del moment actual.

NOTA: No es podrà realitzar RESET quan el termòmetre marca la temperatura del moment actual.

OBSERVACIÓ:

ÉS CONVENIENT QUE LA SONDA ESTIGUI IMMERSA EN EL MATEIX TIPUS DE MITJÀ QUE ESTAN ELS MEDICAMENTS JA QUE SI NO ÉS AIXÍ MESURARIA LA TEMPERATURA DE L'AIRE INTERIOR DEL FRIGORÍFIC I NO LA TEMPERATURA A LA QUAL ES TROBA EL MEDICAMENT.

Per a evitar que el termòmetre registri valors màxims o mínims erronis per obertures del frigorífic i no per avaries, es recomana introduir la sonda en un recipient amb vaselina. La vaselina aconseguirà la mateixa temperatura que el medicament i el termòmetre registrarà exactament les variacions de temperatura que sofreixi el medicament.

CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS

Cod: DI-MIV-PNT-1340

Versió: 1a

1ra versió: desembre - 2024

Versió vigent: desembre - 2024

13. Annex 2:

Aparell:					Codi Aparell:		
Any		XXXX			Ubicació:		
Dia	Hora	Temperatura actual (°C)	Temperatura mínima (°C)	Temperatura màxima (°C)	Codi de l'usuari	Observacions	Informació
	8:00						1. Registreu les temperatures a les hores indicades, abans d'obrir la porta.
	15:00						
	22:00						
	8:00						2. Anoteu la temperatura, actual, màxima i mínima i premeu el botó "RESET"
	15:00						
	22:00						
	8:00						3. Si una temperatura queda fora dels límits de control reviseu el PNT "CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS", per a veure com procedir.
	15:00						
	22:00						
	8:00						4. Deixeu constància escrita de la incidència
	15:00						
	22:00						
	8:00						5. Si el problema persisteix obriu comunicació d'avaría.
	15:00						
	22:00						
	8:00						6. Si és necessari fer canvi del contingut i deixeu constància de la nova ubicació.
	15:00						
	22:00						
	8:00						7. Comuniqueu-ho al supervisor de la unitat o a supervisió de gurdia.
	15:00						
	22:00						
	8:00						Límits de control
	15:00						
	22:00						
							2-8º

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

14. Annex 3:

Taula 1. Comparació de les dades d'estabilitat a temperatura ambient, recollides en guies de diferents hospitals.

*Taula extreta del document "Estabilitat de medicaments termolàbils", Servei de Farmàcia de l'Hospital Universitari de Bellvitge.

Font bibliogràfica		1	2	3	4	5 i 6	
Nom comer	Principi actiu	Estabilitat t ^a	Estabilitat t t ^a	Estabilitat t ^a	Estabilitat t ^a ambient	Estabilitat t ^a ambient (25°C)	Laboratori
Abasaglar®	Insulina glargina	Fitxa tècnica: 28 dies fins a 30°C					
Abelcet®	Anfotericina B complex lipídic	Per cada dia que el producte s'exposa a T ^a ambient la	1 dia fora nevera = 9 dies nevera (canviar data	1 dia fora nevera = 9 dies nevera (canviar data caducitat)	Per cada dia d'emmagatzement a 25 °C la caducitat baixa en 9	-	Cephalon
Actrapid® innolet o vial*	Insulina humana	Estable durant 24h a T ^a ambient. Un cop utilitzat estable 6 setmanes a 25°C. No tornar a	Emmagatzement: 24h a 9-25°C Una cop en ús: 6 setmanes	Emmagatzement: 24h a 9-25 °C Una cop en ús: 6 setmanes	Envàs intacte: 24 hores màxim entre 9-25 °C amb el fi de que es puguin mantenir les condicions de conservació	-	Novo Nordisk Pharma
Actilyse®	Alteplasa 50mg	Conservar entre 2°C i 8°C.	3 anys a <25°C	3 anys a < 25C	No conservar a T ^a superior a 25 °C.	-	Boehringer Ingelheim España
Adtralza®	Tralokinumab 150 mg	FT: Conservar entre 2°C i 8°C. Es poden conservar fins a	Consulta laboratori: Excursió puntual de temperatura de				Leo pharma
Aimovig®	Erenumab					14 dies a temperatura ambient (fins 25°C) Si es conserva a una temperatura superior o durant més temps cal tirar. No tornar a	Novartis pharmaceutical SA.

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Aleudrina®	Isoprenalina	Estable durant 6 mesos a Tª 25°C. A	6 mesos a 25 °C (a aquesta temperatura es redueix 3 mesos	6 mesos a 25 °C (a aquesta temperat	6 mesos a 25 °C (a aquesta temperatura	-	Reig Jofre
Aldurazyme®	Laronidasa		6 mesos a 25°C (reetiquetar)	6 mesos a 25°C (reetiquetar)		Tornar a refrigerar i modificar la caducitat a 6 mesos (reetiquetar) ⁶	SANOFI-AVENTIS,S.A
Alprostadil farmacia®	Alprostadil	Conservar entre +2°C i +8°C. En cas	4 mesos	4 mesos	Consultar al laboratori en caso de incidencia	4 mesos a <25°C (telefònica)	Pfizer
Al·lergens True test®	Al·lergens true test pegat epicutani					Consultar al laboratori en cada ocasió	Martí Tor
Ambisome®	Anfotericina B Liposomal	Conservar a < 25°C.	2 semanas-1mes	2 semanas-1 mes	-	-	Gilead Sciences
Amfotericina B desoxicolat X Gen	Amfotericina B desoxicolat					Estable 5h a 8-18°C. Tornar a refrigerar i	
Amfotericina B desoxicolat inh 6 mg Xalabarder	Amfotericina B desoxicolat 6mg polv nebulització					6 mesos a 25°C. Tornar a refrigerar i mantenir la	Farmàcia Xalabarder
Anbinex®	Antitrombina III	Fitxa tècnica:	-	-	-	Conservar a <30°C	Grifols
Anectine®	Suxametoni	Estable durant 2 setmanes a Tª de 25°C.	2 setmanes a 25 °C	2 setmanes a 25 °C	2 setmanes a 25 °C.	2 setmanes a 25 °C. Tornar a refrigerar i mantenir la	Glaxo SmithKline
Antídoto Digoxina®	Digitalis	Estable durant 20	20 dies fins a 40°C	20 dies fins a	-	-	Roche Farma

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Apidra®*	Insulina Glulisina	Una cop usat, estable fins 4 setmanes a ≤ +25°C protegit del calor	4 setmanes (inclòs temps d'administració)	4 setmanes (inclòs temps d'administració)	Conservar en nevera (entre +2° C y +8° C). No congelar. No exposar a Tª elevada ni a la luz solar	-	Sanofi Aventis S.A.
Apis mellifera	Himenopters (Veri)					Fitxa tècnica: 7 dies màxim a Tª ambient i després es pot retornar a la nevera	ALK ABELLO, S.A.
Aptivus® càps	Tipranavir	Conservar entre +2°C i +8°C. Un cop obert	Emmagatzematge: 60 dies entre 15-30°C Una cop obert: 60 dies a 30°C	Emmagatzematge: 60 dies entre 15-30°C	Durante l'ús: 60 dies por sota de 25 °C.	60 dies entre 15-30°C	Boehringer Ingelheim España
Aranesp®	Darbepoetina alfa	Estable durant 7 dies a Tª ≤ +30°C. Un cop a tª ambient s'ha	-	-	Per ús ambulatori, estable durant un únic període de 7 dies fins 25 °C. Una	7 dies fins 25 °C. Una cop arriba a Tª ambient s'ha d'utilitzar en 7 dies o rebutjar.	Amgen
Atracuri®	Atracuri	Si s'emmagatzema a Tª = +30°C durant un mes es perd un 8% de la potencia	1 mes 30 °C (pèrdua del 8% de la potencia)	1 mes 30 °C (pèrdua del 8% de la potencia)	Se permiten períodos cortos hasta +30° C solo para el transporte o el almacenamiento	1 mes 30 °C (pèrdua del 8% de la potencia) Tornar a refrigerar i mantenir la caducitat ⁶	Inibsa
Avastin®	Bevacizumab	Estable durant 5 dies a 15°C	9h a 30°C; 5 dies a 15°C	9 h a 30°C i 5 dies a 15	12 hores a 30 °C. 5 dies a 15 °C.	9 h a 30°C i 5 dies a 15 °C	Roche Farma
Avonex®	Interferó beta-1A	Estable fins data de caducitat a <25°C (Fitxa tècnica)					Biogen Idec Limited
BCNU (Estranger)	Carmustina	Conservar entre +2°C i +8°C	L'aparició de gotícules indica que el producte no està en condicions de	L'aparició de gotícules indica que el producte	Conservar entre 2-8 °C. L'aparició de gotícules indica que el producte no	Consultar al laboratori.	Bristol Miers
Benepali®	Etanercept	Veure Enbrel					

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Benlysta®	Belimumab	-	-	-	-	12h a 22°C: tornar a refrigerar i mantenir la caducitat ⁶ Juliol 2020 (laboratori)- Ploma: Un cop arriba a 25 °C s'ha d'utilitzar en 12 hores o	Glaxosmithkline
Beriner®	Inhibidor C1 esterasa	Fitxa tècnica: No conservar a temperatura superior					CSL BEHRING GMBH
Binocrit®	Epoetina alfa humana	Conservar entre +2°C i +8°C. Estable 3	-	-	Estable 3 días a T ^a no > +25° C. No	Estable 3 dies a < 25°C	Sandoz Farmacéutica
Bleomicina Mylan®	Bleomicina	Estable durant 28 dies a 25°C	-	-	Estable 28 días a T ^a = +25° C Estable 24 horas a +25° C	Estable durant 28 dies a 25°C Estable durant 24 h a > 25°C	Mylan Pharmaceuticals
Bleomicina®	Bleomicina	28 dies	28 dies	28 dies	28 dies fora de nevera	-	Almirall
Botox®	Toxina botulínica, Tipus A	Conservar entre +2°C i +8°C o en congelador a T ^a < -5°C. Estable	14 dies a 25°C 7 dies a 30°C	14 dies a 25 °C 7 dies a 30°C	Durant 8 dies entre 30-35 °C.	14 dies a 25 °C 7 dies a 30°C	Allergan
Bramitop®	Tobramicina					Fitxa tècnica: les bosses (intactes o abertes) poden conservar-se a < 25°C fins a un màxim de 3 mesos.	Chiesi España, S.A.U
Busilvex®	Busulfà	Estable durant 24 hores a T ^a ≤ +25°C	Anotar lot, caducitat, T ^a i temps d'exposició i contactar amb	Anotar lot, caducitat, T ^a i temps	-	Estable durant 24 hores a T ^a ≤ +25°C. 5 deis entre 8-27°C. Contactar amb el laboratori.	Pierre Fabre Iberica

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Caelix®	Doxorubicina clorhidrat liposomal pegilada	Estable durant 70 hores entre +10°C i	-	Anotar lot, caducitat, Tª i temps	70 hores entre 10-20 °C. 2 setmanes entre 8-10	Estable durant 70 hores entre +10°C i +20°C. Contactar amb el laboratori.	Schering Plough
Calcitonina Almirall®	Calcitonina de salmó	Conservar entre +2 i +8°C.	-	-	-	Conservar entre +2 i +8°C. Estable 4 setmanes a ≤ +22º	Almirall
Calcitonina Hubber®	Calcitonina de salmó	Estable conservat a ≤ +25°C durant 24	1 mes	1 mes	Conservar en nevera per garantir que no es	-	Meda Pharma Sau
Calogen®	Calcitonina de salmó	Conservar entre +2°C i +8°C. Hi ha estudis	-	-	-	-	Prostrakan Farmacèutica
Calsinar®	Calcitonina de salmó	Estable 4 setmanes a +22°C	-	-	-	-	
Cancidas®	Caspofungina	Estable 48 hores a Tª	48h	48h	Màxim 48 hores a Tª	Estable 48 hores a Tª ambient	MSD
Casenfilus® 2g sobres	Lactobacillus					No disposen de dades d'estabilitat ⁶	
Cayston®	Aztreonam					Fitxa tècnica. Estable durant 28	Gilead Sciences
Celsior®	Reservació òrgans	-	-	-	-	12h a 22°C. Tornar a refrigerar i modificar la caducitat a 1 mes	Institus Georges Lopez
Cimzia®	Certolizumab	Estable durant 24 hores a ≤	-	-	-	Estable durant 24 hores a ≤ +25°C	
Cinquaero®	Reslizumab	Fitxa tècnica: Estable 3 anys. Conservar	-	-	*Contactar amb el laboratori que determinarà la seva validesa: informació requerida lot, data de caducitat, temperatura, temps		Teva pharma
Cinryze®	Inhibidor C1 esterasa	Fitxa tècnica: conservar					Shire services BVBA

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Cleviprex®	Clevidipí	-	-	-	-	Conservar i transportar refrigerat (entre 2°C i 8°C). No congelar Conservar el vial en el l'emballatge exterior per protegir de la llum. Consulta lab: 12	
Cluvot®	Factor XIII palmàtic 250UI					FT 24h a <25°C, tornar a refrigerar i mantenir caducitat	
Colircusi Anestèsico	Nafazlina+ tetracaina 0.05+0.1%					Consultar al laboratori en cada ocasió	
Colircusi Anestèsico Doble	Oxibuprocaina+tetracaina 0.4+0.1%					Consultar al laboratori en cada ocasió	Alcon Cusi
Colircusi Cloranfenicol®	Cloramfenicol	Estable durant 3-4 setmanes a Tª	15 dies a 25°C. Un cop obert: 1 mes	15 dies a 25 °C Un cop obert: 1	Màxim 15 dies a 25 °C. En ús, fins 1 mes a 25 °C.	Estable durant 3-4 setmanes a Tª ambient.	Alcon Cusi
Colircusi Dexametasona	Cloramfenicol, Dexametasona	Estable durant 3-4 setmanes a Tª	15 dies a 25°C Un cop obert: 1 mes	15 dies a 25 °C Un cop obert: 1	15 dies a 25 °C Un cop obert: 1 mes	15 dies a 25 °C Un cop obert: 1 mes	Alcon Cusi
Colircusi Fenilefrina®	Fenilefrina clorhidrat	Estable durant 5 dies a Tª ambient. Una cop	1 mes	1 mes	Màxim 15 dies a 25 °C. En ús, fins a 1 mes a 25 °C.	Màxim 15 dies a 25 °C. En ús, fins a 1 mes a 25 °C. Estadets curtes de màxim 15	Alcon Cusi
Colircusi Fluotest®	Fluoresceïna + oxibuprocaina					Consultar al laboratori en cada ocasió	Alcon Cusi
Copaxone®	Glatiràmer acetat	Estable durant un únic període d'1 setmana a	7 dies entre 15-25°C	7 dies entre 15-25°C	De 15 a 25 °C durant un màxim d'1 mes.	7 dies a 25°C. 1 sol cop, després tornar a refrigerar. Tornar a refrigerar i mantenir caducitat	Sanofi Aventis
Cosentyx®	Secukinumab	Fora de nevera un màxim de 4 dies a temperatura				Laboratori (Juliol 2020): Fora nevera màxim 4 dies a Tª amb, després tornar a nevera i conservar	Novartis Europharm Ltd.

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Cresemba®	Isavuconazol vial					90 h a 25°C i tornar a refrigerar i mantenir la caducitat ⁶	
Cubicin®	Daptomicina	Estable durant 96 hores a T ^a < +25° C.	60h a 25°C	60h a 25°C	60 hores per sota de 25 °C.	60h a 25°C. Tornar a refrigerar i mantenir la caducitat ⁶	Merck Sharp Dohme
Custodiol®	Preservació òrgans	Fitxa tècnica: conservar entre 2-15°C				5 dies a 25°C. Reducció de estabilidad a 1 año.	CardioLink
Depocite®	Citarabina liposomal	Conservar entre +2°C i +8°C. En cas	72h a 25°C	72 h a 25°C	72 h a 25°C	72 h a 25°C. Consultar al laboratori.	Combix
Desmopresina Mede®	Desmopresina	Conservar entre +2°C i +8°C	-	-	-	24 h a 25°C Tornar a refrigerar i mantenir la caducitat ⁶	Stada
Ditebooster®	VACUNA ANTITETANICA A+DIFTERICA					14 dies a 25 °C Consultado con laboratorio	Medicare Pharma
Diffavax®**	Toxoide diftèric adsorbit, Toxoide tetànic	Conservar entre +2°C i +8°C. No congelar. En cas	14 dies a 25°C	14 dies a 25 °C	Consultar al laboratori en cas d'incidència.	14 dies a 25 °C Tornar a refrigerar i mantenir la caducitat ⁶	Combino Pharm
Ditanrix®**	Toxoide Tetànic, Toxoide Diftèric	Estable durant 2 setmanes a +21°C. Estable	2 setmanes a 21°C 1 setmana a 37°C	2 setmanes a 21 °C 1 setmana	-	-	Edigen
Doxorubicina Ferrer Farm®	Doxorubicina	Estable durant 14 dies a +25°C	Anotar lot, caducitat, T ^a i temps d'exposició i	Anotar lot, caducitat, T ^a i	Un únic període de fins 7 dies a T ^a inferior a	-	IPS Farma
DT VAX®***	Toxoide diftèric adsorbit, Toxoide tetànic	Conservar entre +2°C i +8°C. No congelar. En cas	-	-	-	-	Normon
Duodopa®	Levodopa/Carbidopa	Estable durant 24 hores a T ^a	4 dies a 25 °C	4 dies a 25 °C	4 dies a 25 °C	Estable durant 24 hores a T ^a ambient	Abbvie

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Dysport®***	Complexe de Toxina Tipus A de Celstridium	Estable durant 3 dies a Tª ambient.	3 dies	3 dies	3 dies a 25 °C.	Estable 3 dies a 25°C. Tornar a refrigerar i mantenir la	UCB Pharma
Dupixent	Dupilumab	Fitxa tècnica: conserva a nevera entre 2 a	-	-	-	Fitxa tècnica: Estable 14 dies a < 25°C i passats aquests dies rebutjar.	sanofi-aventis
Ecalta APPI®	Anidulafungin a pols liofilitzat	Conservar entre +2°C i +8°C. Estable durant 48 hores a +25°C. En	-	-	-	96h a 25°C. Tornar a refrigerar i mantenir la caducitat ⁶	Pfizer
Eligard®	Leuprorelina	Estable dos setmanes a Tª ambient	14 dies a Tª ambient previ a l'ús	14 dies a temperatura ambient	-	-	Alcon Cusi
Empresin®	Vasopresina =argipresina					2 mesos a < 25°C. Tornar a refrigerar i mantenir la caducitat ⁶	Aop orphan pharmaceuticals
Enbrel®	Etanercept	Estable durant mínim de 24 hores a	24h a ≤ 25°C; > 25°C contactar laboratori	24 h a ≤ 25 °C; > 25 °C contactar	24 hores fins 25 °C. Per sobre de 24h o	28 dies fins a 25°C	Pfizer
Enbrel®	Etanercept	Estable 25°C ± 2°C durant 1 mes un sol cicle. No tornar a refrigerar. Si el temps transcorregut > 1 mes, tirar el sobrant. Referència: Shannon E, Daffy J, Jones H, Paulson A, Vicik S. Etanercept (Enbrel®)					
Engerix-B®***	Vacuna antihepatitis B	Estable durant 2 setmanes a 21°C. Estable	3 setmanes a 21°C 1 setmana 37°C	3 setmanes a 21°C 1 setmana 37°C	2 setmanes fins a 21 °C 1 setmana fins a 37 °C.	-	
Entyvio®	Vedolizumab	Reconstituït i immediatament diluït és estable			No hay impacto en la estabilidad expuesto a: 20°C a 2°C: 5 días máximo	Consultar el laboratori Laboratori (Juliol 2020): Fora nevera 40h a Tª amb. Rebutjar medicació, no es recomana el seu ús	Takeda
Emgality®	Galcanezumab					Fitxa tècnica: 7 dies a temperatura fins a 30 °C. Si s' excedeixen aquestes condicions, cal tirar.	

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Empressin®	Argipresina					Fitxa tècnica: conservar en nevera (2 °C – 8 °C) Consulta mail: 2 mesos a temperatura ambient. Tornar a posar en nevera i mantenir la caducitat del lot	
Epirubicina Maine®	Epirubicina	Conservar entre	-	-	-	Consultar el laboratori	Sanofi Aventis
Epopen®	Epoetina alfa humana	Estable durant 6 hores a +25°C. No congelar. Per ús	-	-	-	-	Novartis Farmacéutica
Eporatio®	Epoetina Theta	Estable si s'ha conservat a ≤	-	-	-	-	Mundipharma Pharmaceuticals
Eprex®	Epoetina alfa humana	Conservar entre +2°C i +8°C. Per ús	-	-	-	3 dies ≤+25°C No congelar.	Reig Jofre
Erbix®	Cetuximab	Estable durant 20	20h	20h	48 hores a 25 °C durant su	20 hores a 25°C.	Sanofi Pasteur
Erelzi®	Etanercept	Veure Enbrel					
Esmeron®	Rocuronio	12 setmanes	12 setmanes a <30°C	12 setmanes	Màxim 3 mesos entre	3 mesos ≤ 30°C.	Glaxo Smithkline
Etalpa®	Alfacalcidol	Estable durant 1	1 any a 25°C	1 any a 25°C	Estable durant 1 any	Estable durant 1 any a +25°C	Ferrer Farma
Eylea®	Aflibercept	-	-	-	-	< 25°C màxim de 24h	Bayer
Fabrazyme®	Agalsidasa beta	Estable durant 6 mesos a Tª	-	-	-	Tornar a nevera i modificar la caducitat a 6 mesos ⁶	Solvai Pharma
Fanndi®	Factor VIII plasmàtic	Fitxa tècnica: estable 3 anys					
Farmiblastina®	Doxorrubicina	Conservar entre +2°C i +8°C. En cas d'incidència,	< 1 mes	< 1 mes	Estabilidad a 25 °C ± 3 °C: Doxorrubicina HCL: 2 años, tampó: 3	Estable < 1 mes a Tª ambient (màxim +22°C a +25°C).	Ipsen Pharma

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Farmorubici na®	Epirubicina	Conservar entre +2°C i +8°C. En	Anotar lot, caducitat, Tª i temps d'exposició i	Anotar lot, caducitat, Tª i	Anotar lot, caducitat, Tª i temps d'exposició i	Consultar al laboratori	Pfizer
Faslodex®	Fulvestrant	Estable durant 12 mesos a <	-	-	-	-	AstraZene ca
Fasenra®	Benralizumab	Fitxa técnica: conserva r entre 2 a 8°C. Un cop		-	-	Estable 24h entre 25 i 40 °C. Tornar a refrigerar i mantenir caducitat (estable fins 36 mesos post incidència)	AstraZene ca Farmacéu tica
Feiba®	Fracció antiinhibidor F VIII	Conservar entre +2°C y	Conservar entre +2°C y +8°C. No congelar	6 mesos	-	-	Baxalta
Famotidina ®	Famotidina	-	-	-	-	Estable durante 6 meses a Tª ambiente.	Fresenius
Fasturtec®	Rasburicasa	Estable durant 15 días a Tª	15 dies a 25°C	15 dies a 25°C	Màxim 15 dies fins a 25 °C.	-	Sanofi- Aventis
Fetroja	Cefiderocol					Estable 24h a <30°C. Tornar a refrigerar i mantenir caducitat ⁶	
Filgrastim Accofil®	Filgrastim	15 dies a 25°C	-	-	-	Fitxa técnica: Màxim: 15 dies a 25°C No tornar a nevera i modificar la caducitat a 15 dies	Accord Healthcar e
Fluarix®***	Virus gripals inactivats fraccionats	Estable durant 1 setmana a	-	-	-	-	Glaxo Smithklin e
Folinat	Folinat càlcic	-	7-14 dies a 25°C	7-14 días a 25°C	-	Tornar a refrigerar i mantenir la caducitat ⁶	Teva
Forsteo®	Teriparatida	Estable 14 dies a +10°C. Estable 7 dies a +15°C. Estable	-	-	-	-	Lilly
Fortovase®	Saquinavir	Estable durant 11 dies a +25°C.	-	-	-	-	Roche Farma

CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS

Cod: DI-MIV-PNT-1340

Versió: 1a

1ra versió: desembre - 2024

Versió vigent: desembre - 2024

Gammagard S/D®	Immunoglobulina	Conservar entre	-	-	-	-	Baxter
Gamma Antitètanus Grifols® ***	Inmunoglobulina antitetànica	Estable durant 18 mesos a 25°C ± 2°C. Estable	12 mesos a 25°C 3 mesos a 35°C	12 mesos a 25°C 3 mesos a 35°C	12 mesos a 25°C 3 mesos a 35°C	12 mesos a 25°C 3 mesos a 35°C Tornar a refrigerar i mantenir caducitat ⁶	Institut Grifols
Gammaglobulines específiques®	Gammaglobulina antihepatitis	Estable durant 3 mesos a 25°C ± 2°C	3 mesos a 25 °C i 2mesos a 35 °C	3 mesos a 25°C 2mesos a 35°C	1 mes a 35°C	-	Grifols
Gamunex®	IGIV	FT: 6 mesos a 25°C					
Genotonorm kabipen®	Somatropina	Estable 1 mes a ≤ 25°C	6 mesos a 25°C, no tornar a refrigerar	6 mesos a 25°C, no tornar a refrigerar	Estable a ≤ 25°C durant màxim 6 mesos. No tornar a refrigerar.	Sense reconstituir: 6 mesos a 25°C, 1 mes a T<40°C Reconstituit: 24 h a 2-8°C Laboratori (Juliol 2020): Estabilitat de 6 mesos a Tª ambient. En una única excursió de	Pfizer
Glucagó Gen®	Glucagó clorhidrato	Estable durant 24 hores a +25°C. Es pot	-	-	Màxim 24 hores fins 25 °C. En ús, durant 18 mesos a	18 mesos a 25°C. Consultar el laboratori	Novo Nordisk Pharma
Gonapeptil®	Triptorelina	Estable 24	-	-	-	-	Ferring
Gripavac®***	Virus gripals inactius fraccionats	Conservar entre +2°C i +8°C. No congelar.	-	-	-	-	Sanofi Pasteur MSD
Havrix® ***	Vacuna hepatitis A	Estable durant 2 setmanes a 21°C. Estable	2 setmanes a 21°C 1 setmana a 37°C	2 setmanes a 21°C 1 setmana a 37°C,	2 setmanes fins a 21°C 1 setmana fins a 37 °C.	-	Glaxo SmithKline
Hemoleven®	FACTOR XI PLASMATIC	Estable 24h a 25°C tres	-	-	-	72h a 25°C. Consultar el laboratori	Excelsia Pharma
Hepatect®	IMMUNOG ANTIHEPATITIS B					Consultar cada vez a laboratorio: olga.arriazu@biotest.co	Bio Test
Herceptin®	Trastuzumab	Estable 18urant 8	30 dies a 40°C 3 dies a 50°C	30 dies a 40 °C	30 dies fins 40 °C.		Roche farma

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Hizentra®	Inmunoglobulina Humana Normal (SCIg)	-	-	-	-	30 mesos (període validesa) a una temperatura inferior a 25 °C. Conservar el vial en el embalatge exterior per a protecció de la llum.	CSL Behring
Humalog®*	Insulina humana lispro	Estable 14 dies a +10°C. Estable 7 dies a +15°C. Estable 4 dies a +20°C. Estable 48 hores a +25°C.	Emmagatzement: 7 dies (20°C), 24 h (25°C), 12 h (30°C), 12 h (35°C) Una cop en ús: 28 dies (25°C)	Emmagatzement: 7 dies (20°C), 48 h (25°C), 48 h (30°C), 24 h (35°C) Una cop en ús: 28 dies (25°C)	Els envasos intactes: 4 dies a 20 °C 48 hores a 25 °C 24 hores a 30 °C 12 hores a 35 °C En ús 28 dies a temperatura	Estable 14 dies a +10°C. Estable 7 dies a +15°C. Estable 4 dies a +20°C. Estable 48 hores a +25°C. Estable 24 hores a +30°C. Estable 12 hores a +35°C. Estable 6 hores a +40°C. Una cop en ús, estable fins 28 dies a +30°C.	Lilly
Humatrope®	Somatropina	Estable 28 dies a +10°C. Estable 20 dies a +15°C. Estable 11 dies a +20°C. Estable 6 dies a +25°C.	6 dies a 8-25°C 72h a 25-30°C 24h a 30-40°C	6 dies a 8-25°C 72h a 25-30°C 24h a 30-40°C	6 dies entre 8-25 °C. 72 horas entre 25-30 °C. 24 horas entre 30-40 °C.	Estable 28 dies a +10°C. Estable 20 dies a +15°C. Estable 11 dies a +20°C. Estable 6 dies a +25°C. Estable 4 dies a +30°C*. Estable 2 dies a +35°C. No usar si exposició a T _a < 0°C o > +40°C. *Preferentment: Exposició diària a T ambient <30 min	Lilly
Humira®	Adalimumab	Estable durant 24 hores a +30°C. Estable a -1°C fins a la data de caducitat	8h	8h	1 dia a 30 °C.	Fitxa tècnica: 14 dies a ≤25°C. Si se queda fuera de nevera. (menos 18h a a <25°C); se puede devolver a la nevera y mantener la fecha de caducidad. Consultar siempre a laboratorio	Abbvie
Hyrmoz®	Adalimumab					Fitxa tècnica: 21 dies a ≤25°C. No tornar a la nevera i tirar si passen >21 dies des de que s'ha	

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Humulina®*	Insulina isofànica bifàsica humana (30% de insulina soluble i 70% de insulina isofànica)	Estable 14 dies a +10°C. Estable 7 dies a +15°C. Estable 4 dies a +20°C. Estable 48 hores a	Emmagatzemament: 4 dies (20°C), 48 h (25°C), 24 h (30°C), 12 h (35°C) Una cop en ús: 28 dies (25°C)	Emmagatzemament: 4 dies (20°C), 48 h (25°C), 24 h (30°C), 12 h (35°C). Una cop	-	Estable 14 dies a +10°C. Estable 7 dies a +15°C. Estable 4 dies a +20°C. Estable 48 hores a +25°C. Estable 24 hores a +30°C. Estable 12 hores a +35°C. Estable 6 hores a +40°C. Una cop en ús, estable	Lilly
Hicamtin®	Topotecan	Conservar entre +2°C i +8°C. En cas d'incidència	Anotar lot, caducitat, Tª i temps d'exposició i contactar amb laboratori	Anotar lot, caducitat, Tª i temps d'exposició	-	Anotar lot, caducitat, Tª i temps d'exposició i contactar amb laboratori	Glaxo Smithkline
Hyqvia®	Inmunoglobulina Humana Normal (SClg)	-	-	-	-	Si només ha hi hagut una excursió de la Tª, retornar a la nevera i mantenir caducitat. Estabilitat fora nevera: - >8°C a ≤25°C: 3 mesos - >25°C a ≤30°C: 7 dies - >30°C a ≤40°C: 2 dies	Takeda Medical
Hyrimoz®	Adalimumab	-	-	-	-	Estable >8°C a ≤25°C durant 14 dies, inclús si s'ha retornat a la nevera després de l'excursió de Tª. Consultar laboratori.	
Igamplia®	Immunoglobulina inespecífica IM					Estable a 25 ± 2 °C durant 18 mesos, a 30 ± 2 °C durant un 20eríodo de 30 mesos i 35 ± 2°C durant 2 mesos	Grifols
Igantibe®	Immunoglobulina anit hepatitis IM					25 ± 2 °C i 35 ± 2 °C mostren que a 3 mesos i a 2 mesos, respectivament, es produeix una pèrdua de l'activitat Anti-HB considerada equivalent a la que es	Grifols

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Insulatard® * Humulina NPH®*	Insulina isofànica humana	Estable durant 24 hores a +25°C. Una cop en ús, estable fins 6 setmanes a +25°C. No congelar	Emmagatzemam ent: 24h a 9- 25°C Una cop en ús: 4 setmanes	Emmagatzemamen t: 24 h a 9-25 °C. Una cop en ús: 4 setmanes	Envasos intactes: màxim 24 hores entre 9-25 °C. En ús: màxim 6 setmanes a < +30 °C.	Estable 14 dies a +10°C. Estable 7 dies a +15°C. Estable 4 dies a +20°C. Estable 48 hores a +25°C. Estable 24 hores a +30°C. Estable 12 hores a +35°C. Estable 6 hores a +40°C. Una cop en ús, estable fins 28 dies a +30°C.	<i>Novo Nordisk Pharma</i>
Ilaris®	Canakinumab	-	-	-	-	Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar. Conservar en el embalatge original per a protegir-ho de la llum. Laboratori (Juliol 2020): Fora nevera 40h a Tª	<i>Novartis</i>
Kaletra® solució oral	Lopinavir/ ritonavir	Estable durant 6 setmanes a Tª inferior a	42 dies	42 dies	6 setmanes a Tª inferior a 25 °C i 1 dia a 30 °C.		<i>Abbott Laboratori es</i>
Kevzara	Sarilumab	-	-	-	-	Fitxa tècnica: conservar en nevera 2-8 °C. Un cop fora de la nevera estable 14 dies a T<25°C. Protegir de la llum Laboratori (Juliol 2020): Estabilitat si < 96 hores	<i>Sanofi- aventis</i>
Kyntheum	Brodalumab	Fitxa tècnica: estable 4 anys conservar en nevera 2 i 8 °C, fora de la nevera un cop atemperat estable 14 dies a T<25°C. Protegir de la llum.				Consultar laboratori. Laboratori (Juliol 2020): 9°C a 30°C estable durant 14 dies, un únic cop. Si l'excursió de temperatura es <24 hores es retorna a la	<i>LEO Pharma</i>
Kiovig®	Inmunoglobul ina normal	Conservar entre +2°C i +8°C. Estable 9	9 mesos. No tornar a refrigerar	9 mesos. No tornar a refrigerar	-	No conservar a temperatura superi a 25°C. No congelar. Conservar en el embalatge original per a	<i>Baxter</i>
Lantus®*	Insulina glargina	Una cop en ús, estable fins 4	4 setmanes a <30°C (inclòs temps d'utilització)	4 setmanes a < 30°C (inclòs)	1 mes a 25 °C (inclòs el temps d'utilització).	1 mes a 25 °C (inclòs el temps d'utilització).	<i>Sanofi Aventis S.A.</i>
Latanoprost Ratiopharm®	Latanoprost	Estable fins 16	1 mes a 25°C	1 mes a 25 °C	-	-	<i>Ratiophar m</i>

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Ledaga®	Clometina	FT: Tub sense obrir 3 anys (-15 °C a -15 °C a	Després de descongelar: 7 dies (-15°C a 2°C)	-	-	-	<i>Recordati Rare Diseases</i>
Lemtrada®	Alemtuzumab	-	-	-	-	12-24h a 25°C Tornar a refrigerar i modificar la caducitat a 6	
Leukeran®	Clorambucilo	Conservar entre +2°C i +8°C. En cas	Anotar lot, caducitat, Tª i temps d'exposició i contactar amb	Anotar lot, caducitat, Tª i temps	Consultar al laboratori en cas d'incidència.	-	<i>Wellcome Farmacèutica</i>
Levemir®*	Insulina detemir	Estable durant 24 hores a Tª ambient. Una cop		Una cop en ús: 6 setmanes (no refrigerar	Una cop en ús: 6 setmanes (no refrigerar una cop obert)	-	<i>Novo Nordisk Pharma</i>
Levotiroxina®	Levotiroxina	-	-	-	-	1 mes a <25°C. Tornar a refrigerar i mantenir la caducitat ⁶	<i>Sanofi</i>
LHRH Ferring	Gonadorelina	-	-	-	-	15 dies a 25°C. Tornar en nevera i mantenir caducitat ⁶	<i>Ferring</i>
Lidocaina+f enilefrina 4+0,5% gotes nasals (FM)						Consultar cada caso con area de farmacotecnia	
Lucentis®	Ranibizumab	Conservar entre +2°C i +8°C. En cas	Anotar lot, caducitat, Tª i temps d'exposició i contactar amb	Anotar lot, caducitat, Tª i temps	El laboratori valorarà cada cas en particular	24h a 25°C. Tornar a refrigerar i mantenir la caducitat ⁶	<i>Novartis Farmacèutica DL</i>
Mabthera®	Rituximab	Estable durant 8 dies i 9 hores a +30°C	18 dies a < 30°C	18 dies a < 30°C	Màxim 18 dies a Tª que no superi els 30 °C.	Màxim 18 dies a Tª que no superi els 30 °C. Tornar a refrigerar i mantenir la caducitat ⁶	<i>Roche Farma</i>
Melfalà Glaxosmithkline®	Melfalà	Estable durant 6 setmanes a +25°. Estable durant	Anotar lot, caducitat, Tª i temps d'exposició i contactar amb laboratori	Anotar lot, caducitat, Tª i temps d'exposició i	Consultar al laboratori en cas d'incidència.	-	<i>Glaxo Smithkline</i>

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Menjugate® ***	Vacuna meningococ C	Estable durant 1 any a Tª ambient. Estable durant 3 mesos a	6 mesos a 30°C i 1 setmana a 40°C. Es recomana rebutjar	6 mesos a 30°C i 1 setmana a 40°C. Es recomana rebutja	1 setmana a 40 °C i 6 mesos a 30 °C	-	Esteve
Methergin	Metilergometrina	-	-	-	-	2 setmanes a 25°C. No congelar. Tornar a refrigerar i mantenir la caducitat ⁶	Novartis Farmacèutica
Miacalcic	Calcitonina de salmó	Estable durant 16 hores a Tª	1 mes	1 mes	-	4 setmanes a 22°C	Novartis Farmacèutica
Miacalcic nasal®	Calcitonina de salmó	Una cop en ús, estable fins 4 setmanes a ≤ +22°C. Si hi ha	1 mes	1 mes	-	-	Novartis Farmacèutica
Minurin®	Desmopresina	Estable 24 hores +25°C	24 h	24 h	Màxim 24 hores a 25 °C.	24 hores a 25 °C. 12h a 22°C: Tornar a refrigerar i mantenir caducitat ⁶	Ferring
Minurin gotes®	Desmopresina	Estable 3 setmanes a 25°C	1 mes	1 mes	-	7 dies a 25°C i 4 setmanes un cop obert. 12h a 22°C: Tornar a refrigerar i mantenir caducitat ⁶	Ferring
Mircera®	Epoetina beta-metoxipoliètil·lic	Estable durant 5 dies a 15°C. Estable durant 3 dies a	1 mes a ≤ 30 °C. No tornar a refrigerar	1 mes a ≤ 30 °C. No tornar a refrigerar	-	-	Roche Farma
Mixtard®*	Suspensió d'insulina humana (30% d'insulina soluble i 70% d'insulina isofànica)	24 h a 9-25 °C. Un cop en ús: 4 setmanes	24 h a 9-25 °C. Un cop en ús: 4 setmanes	24 h a 9-25 °C. Un cop en ús: 4 setmanes	-	-	Novo Nordisk Pharma

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Miocet®	Doxorrubicina liposomal	2 anys a + 25°C per la doxorubicina HCL i 3 mesos pel tampó i infeccions	< 1 mes	< 1 mes	L'estabilitat a 25 °C ± 3 °C: - Doxorubicina HCL: 2 anys, -tampó: 3 mesos	-	Cephalon
Myozime®	Alglucosidase alfa	Estable durant 6 mesos a Tª ambient entre + 2°C i + 25°C	-	-	-	12h a 22°C: Tornar a refrigerar i modificar la caducitat a 6 mesos ⁶	Genzyme
Navelbine®	Vinorelbina	Estable durant 15 dies a < +30°C.	1 mes a <25°C, 15 dies a <30°C. Es pot congelar	1 mes a < 25°C, 15 dies a < 30°C Es pot	15 dies a 30 °C.	15 dies a < 30°C. 1 mes a < 25°C	Pierre Fabre Iberica
Neorecormon®	Epoetina beta	Estable durant 5 dies i 21 hores a +30°C.	3 dies	3 dies	Màxim 4 dies fins 25 °C.	Sense reconstituir: un màxim de 5 dies fora de la nevera (<25°C). Reconstituït: màxim el temps necessari per a preparar les injeccions .	Roche Farma
Neulasta®	Pegfilgrastim	Conservar entre +2°C i +8°C. Estable a < +30°C durant un únic període de 72 hores. Si sobrepassa aquest	72h a Tª <30°C	72 h a temperatura < 30 °C	Un únic període de 72 hores a < 30 °C.	72h a Tª <30°C. Estable durant un únic període de 24 hores a Tª de congelació fins - 20°C. Descongelar posteriorment en un refrigerador.	Amgen

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Neupogen®	Filgrastim	Estable entre +9°C i +30°C durant un període únic de 7 dies si es conserva sense obrir i protegit de la llum. Transcorregut aquest	7 dies de 9-30°C	7 dies de 9-30 °C	1 setmana a < 30 °C.	5 dies (120h) a < 30 °C	Amgen
Neupro®	Rotigotina	Estable 25 durant 7	7 dies a 25°C	7 dies a 25 °C	-	-	UCB Pharma
Neurobloc®	Toxina botulínica (tipo B)	Estable durant 3 mesos a ≤ 25°C. No	-	-	-	-	Eisai Farmacéutica
Nimbex®	Cisatracuri	Estable durant 2 setmanes a Tª de 23°C. Cada mes que el	1 mes a 25°C: 5% degradació del producte. 1 dia fora de nevera equival a 10 dies en nevera	1 mes a 25°C: 5% degradació del producte 1 dia fora de nevera	Es degrada a una velocitat del 5% al mes si s'emmagatzema a a 25 °C. És estable	Tornar a refrigerar i mantenir la caducitat ⁶	GlaxoSmithkline
Nipent®	Pentostatina	Conservar entre	-	-	-	-	Hospira
Niuliva®	Inmunoglobulina antihepatitis B	A + 25°C i +30°C es manté una	-	-	-	-	Instituto Grifols
Novomix®*	Suspensió d'insulina humana (30% aspart i 70% aspart protamina)	Estable durant 24 hores a Tª ambient. Una cop en ús, estable	24h a 25°C Una cop en ús: 4 setmanes	24h a 25°C. Un cop en ús: 4 setmanes	-	-	Novo Nordisk Pharma
Novorapid®*	Insulina aspart	Estable durant 24 hores a Tª ambient. Una cop en ús.	24h a 25°C Una cop en ús: 4 setmanes	24h a 25°C Un cop en ús: 4 setmanes	-	-	Novo Nordisk Pharma

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Novoseven® *	Eptacog alfa (activat)	Conservar a <25°C Estable durant 24	Estable durant 24 hores a 25°C	Estable durant 24 hores a 25°C	Màxim 24 hores entre 9-25 °C.	Conservar a <25°C Estable durant 24 hores a 25°C.	Novo Nordisk Pharma
Noxafil®	Posaconazol					Estable 12h a <25°C, conservar altra vegada en nevera i mantenir la caducitat (consultat amb el laboratori)	MSD
Nplate® **	Romiplostim	Els vials sense reconstituir són estables fins 240 hores acumulades (10	-	-	-	2 setmanes a 30°C	Amgen
Nucala®	Mepolizumab		-	-	-	Fitxa tècnica: estable 3 anys conserva per sota de 25°C	gsk
Nulojix®	Belatacept			-	-	Consultar al laboratori en cas de desviació. Fitxa tècnica: conservar entre 2 a 8°C	BRISTOL-MYERS SQUIBB
Nutropin®	Somatropina	Conservar entre +2 i +8°C. No	Rebutjar (no hi ha dades)	Rebutjar (no hi ha dades)	No hi ha dades	Conservar en nevera (entre 2°C i 8°C). No congelar.	lpsen Pharma
Nuvachten Depot®	Tetracosáctid	Conservar entre +2°C i +8°C	1-3 mesos a <25°C	1-3 mesos a <25°C	Treure de la nevera abans de l'administració. Rebutjar si en algún	3 mesos a <25°C	Defiante Pharmaceutica
Nuvaring®	Etinilestradiol, Etonogestrel	Estable durant 4 mesos a <25°C	-	-	-	-	Schering Plough
Ocrevus®	Ocrelizumab					Consultar al laboratori en cas de desviació. Laboratori (Juliol 2020 i Novembre 2023): 40 - 48h a Tª amb. Tornar a nevera i conservar condicions. Fitxa tècnica: conservar entre	
Octanate®	Factor VIII	Conservar	-	-	2 anys	-	Octaphar
Octreotida GP Pharm®	Octreòtid	Conservar a Tª inferior a	15 dies a <25°C	15 dies a <25°C	15 dies a <	72h a <25°C	GP-Pharm

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Omnitrope®	Somatropina	Conservar entre +2°C i +8°C. En cas	1 dia a 25°C 15 dies a 15°C 2 setmanes a 0°C o entre -2 i -5°C.	1 dia a 25 °C 15 dies a 15°C 2 setma		Reconstituït: estabilitat 24 h entre 2°C i 8°C, en el embalatge original. Sense reconstituir: Conservar entre +2°C i +8°C	Sandoz Farmacéutica
Oncaspar®	Pegaspargasa	Estable durant 48	-	-	Durant 48	-	Rottapharm
Oncotice®	BCG Soca TICE	Conservar entre +2°C i +8°C	-	-	-	Reconstituït: màxim 2 h entre 2 a 8°C i protegit de la llum. No dades de estabilitat fora de la nevera sense reconstituir. CAL TRUCAR AL LABORATORI INDICANT EL LOT I INTERVAL DE TEMPERATURA	Schering Plough
Onpattro®	Patisiran	-	-	-	-	Conservar entre +2°C i +8°C. Es pot emmagatzemar a temperatura ambient fins a 25 °C durant un màxim de 14 dies	Alnylam Netherlands B.V.
Optison®	Octafluoropropano	Conservar entre	-	-	-	-	Amersham Health
Orencia®	Abatacept	21h a < 25°C. Tornar a refrigerar	-	-	-	Consultar al laboratori. Juliol 2020: 40h a Tª amb. No es pot usar per que no es pot descartar el risc. Septiembre (2024): estable 24h	BMS
Orfadin®	Nitisinona	Durant l'ús ambulatori,	-	-	-	-	Swedish Orphan International Spain
Orthoclone OKT3®	Muromonab-CD3	Estable 1 setmana a +30°	1 setmana a 30 °C si falten 6 mesos per la data de caducitat. 48h a 25 °C si falten 3	1 setmana a 30°C si falten 6 mesos	-	-	Janssen-Cilag
Oseototal nasal®	Calcitonina de salmó	Conservar entre +2°C i +8°C . Un	En ús un màxim de 1 un mes	En ús un màxim de 1 un mes	-	Conservar en nevera (entre +2° C i +8° C). Després del primer ús: pot conservar-se a Tª < +22° C fins a un màxim de 4 setmanes. En el cas de que no es pugui mantenir a < +22° C, es millor conservar el fàrmac en la nevera.	Novartis Farmacéutica
Osigraft®	Eptoterminalfa	Conservar entre	-	-	-	-	Striker Iberica

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Ospor nasal®	Calcitonina de salmó	Conservar entre +2°C i +8°C. Una cop obert l'envàs, és estable durant 4	En ús un màxim de 1 un mes	En ús un màxim de 1 un mes	-	Conservar en nevera (entre +2° C i +8° C). Després del primer ús: pot conservar-se a Tª < +22° C fins a un màxim de 4 setmanes. En el cas de que no es pugui mantenir a < +22° C, es millor conservar el fàrmac en la nevera.	Merck Farma I Química
Osteobion nasal®	Calcitonina de salmó	Conservar entre +2°C i +8°C. Un cop en ús, estable 72 hores a Tª	En ús un màxim de 1 un mes	En ús un màxim de 1 un mes	-	Conservar en nevera (entre +2° C i +8° C). Després del primer ús: pot conservar-se a Tª < +22° C fins a un màxim de 4 setmanes. En el cas de que no es pugui mantenir a < +22° C, és millor conservar el fàrmac en la nevera.	Centrum
Ovitrelle®	Coriogona-dotropina alfa	Conservar entre +2°C i +8°C. Establ	30 dies	30 dies	-	Conservar a < 25 °C durant un màxim de 30 dies sense tornar a refrigerar durant aquest període.	Merck Farma I Química
Parsabiv®	Etelcalcetida					Màxim 7 dies acumulats fora de nevera (no requereix cap Tª especial de conservació), i després es pot tornar a refrigerar.	Amgen
Pegintron®	Interferó alfa-2b pegilat	Un cop detectada la ruptura de cadena de fred, conservar immediata	18 mesos a Tª<25°C	18 mesos a < 25°C	2 setmanes a Tª menor de 25°C.	18 mesos a < 25°C	Schering Plough
Pentavac®	Bordetella pertussis, Toxoide diftèric, Toxoide 28urant28, Haemophilus 28urant28or B-PRPT, Virus	Conservar entre +2°C i +8°C. No congelar. En cas d'incidència, contactar amb el	-	-	-	-	Sanofi Pasteur MSD
Plasbumin®	Albúmina humana	No conservar a > +20°C	-	-	-	No conservar a > +30°C	Baier

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Pneumo 23®***	Streptococcus Pneumoniae polisacàrid	Conservar entre +2°C i +8°C. No congelar. En cas d'incidència	-	-	Consultar al laboratori en cas d'incidència	Consultar al laboratori en cas d'incidència.	Sanofi Pasteur MSD
Pneumovax®**	Streptococcus Pneumoniae polisacàrid	Conservar entre +2°C i +8°C. No congelar. En cas d'incidència	-	-	-	Consultar al laboratori en cas d'incidència.	Sanofi Pasteur MSD
Polsites®	Himenopters (Verí)					Fitxa tècnica: 7 dies màxim a Tª ambient i després retornar a la nevera mantenint caducitat	Alk
Praxbind®	Idarucizumab	Fitxa tècnica: temperatura					Boehringer Ingelheim International GmbH
Prepidil®	Dinoprostona	Estable 1 mes a < 25°C	1 mes	1 mes	48 hores	-	Pfizer
Prevenar®***	Streptococcus Pneumoniae polisacàrid conjugat	Estable durant menys de 24 hores a < 25°C	24 h a ≤ 25 °C, S'aconsella rebutjar	24 h a ≤ 25 °C, S'aconsella rebutjar	24 hores fins 25 °C. Per cobrir	-	Pfizer
Prolia®	Denosumab	Es pot conservar fora de la nevera (<25°C), durant un					AMGEN EUROPE B.V
Puregon®	Gonadotropina	-	3 mesos a < 25°C, Un cop obert un mes a < 25°C	3 mesos a < 25°C Un cop obert un	-	-	Organon Española
Praluent®	Alirocumab	-	-	-	-	Es pot conservar fora de la nevera (<25°C), durant un període màxim de 30 dies. S'ha d'utilitzar dins d'aquests 30 dies.No tornar a guardar en	Sanofi
Priorix®***	Neomicina sulfat; Virus Parotiditis; Virus Xarxampió; Virus	Estable durant 4 dies a +23°C. Es pot congelar	-	-	-	-	Glaxo Smithkline

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Privigen®	Immunoglobulina	No conservar	-	-	-	-	CSL Behring
Prolastina®	Alfa-1-Antitripsina	Estable durant 24	-	-	-	-	Berna Biotech
Proleukin®	Aldesleukina	Estable durant 24	-	-	Màxim de 24	-	Novartis Farmacéu
Prostaglandina E2	Dinoprostona	Estable durant 48	1 mes a 25°C	1 mes a 25°C	48 hores	1 mes a 25°C	Pfizer
Protamina	Protamina sulfat	Estable durant 48	-	-	48 hores	48 hores a 25 °C.	Hospira
Prothromplex	Protrombina complex	Conservar entre +2°C i +8°C. No	6 mesos	6 mesos	Fins 6 mesos a Tª	-	Baxter
Puregon®	Folitropina beta	Estable durant un únic període de 3 mesos a	3 mesos a <25°C, un cop obert 1mes	3 mesos a < 25°C, un cop obert 1mes	-	-	Schering Plough
Rapamune® sol oral	Sirolimus	Estable durante menys de	24h a 25°C	24h a 25°C	24h a 25°C	Màxim 24 hores a 25°C	Pfizer
Ratiogastrom®	Filgrastim	Estable durant 24 hores a	-	-	-	-	Ratiopharm
Rebif®	Interferó BETA 1-A	Estable durant 6 dies a +25°C. Una cop en ús, estable durant un	6 dies 25°C. Un cop en ús: 1mes	6 dies 25°C. Un cop en ús: 1mes	No hi ha dades (nova formulació).	6 dies 25°C. Un cop en ús: 14 dies Fitxa tècnica: <25°C durante un único periodo máximo de 14 días. Después, Rebif debe volver a colocarse en la nevera y utilizarse antes de la fecha de caducidad.	Merck Farma l Química
Recombinante®	Factor antihemofílico (recombinant)	Estable durant 6 mesos a Tª entre +15°C i +25°C.	-	-	-	-	Baxter
Refacto AF®	Morotocog alfa (Factor VIII de coagulació recombinant)	Estable durant un únic període de 3 mesos a ≤ +25°C.	3 mesos a 25°C. Després d'aquest període no es pot tornar a refrigerar	3 mesos a 25°C. Després d'aquest període no es pot	Estable a 25 °C durant un únic períod	-	Pfizer
Regitina®	Mesilat de fentolamina	NO DADES	7 dies a 25°C o 2 dies a 30°C	7 dies a 25°C o 2	-	-	Novartis Farmacéu
Regrane x®	Becaplermina	Conservar entre +2°C	-	-	-	-	ESTEVE

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Remicade®	Infliximab	Conservar entre +2°C i +8°C. Estable durant 39 setmanes a +30°C.	12 mesos	12 mesos	En un estudi realitzat amb 5 lots, l'estabilitat s'ha mantinut	Laboratori (Juliol 2020): 39 setmanes a 30°C. 12 mesos a 22-25°C. Fitxa tècnica: màxim 6 mesos a temperatura de fins a màxim de 25 °C durant un únic període, sense sobrepassar la data de caducitat inicial. No es pot	Schering Plough
Remsima® vials	Infliximab	Si Ta< 25°C estable durant 6 mesos. No es pot retornar a la nevera.				Laboratori (Diciembre 2023): Excursions de temperatura de corta duració durante almacenamiento o Reparto: 6 meses 25±2°C 3 meses 40±2°C 30 días -25±5°C 60 meses a temperatura de nevera después de excursiones de tª	KernPharma
Remsima® plomes	Infliximab	FT: Conservar a temperatura					CELLTRION HEALTHCARE
Reopro®	Abciximab	Estable durant 72 hores a < +30°C	8 dies a 28°C (192 hores)	8 dies a 28°C (192 h)	72 hores (inclou el	8 dies a 28°C 12h a 22°C: tornar a refrigerar i mantenir caducitat ⁶	Lilly
Replagal®	Agalsidasa alfa	Conservar entre +2°C i +8°C. Estable	24h	24h	24 h	Estable durant 24 hores. Consultar al laboratori en cas de desviació.	SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES
Rephata®	Evolocumab	-	-	-	-	Fitxa tècnica: Estable a <25°C un màxim de 1 mes, s'ha de utilitzar dins d'aquest període. No es pot	Amgen
Retacrit®	Epoetina Zeta	Conservar entre +2°C i +8°C. Per ús ambulatori, estable durant 3 dies a ≤	-	-	-	A<25°C durant un màxim de 3 dies	Hospira
Rhophila c®	Immunoglobulina anti-Rh (D)***	Conservar entre +2 i +8°C. No congelar	-	-	-	-	CSL Behring

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Riastap®	Fibrinògen					Conservar a < 25°C Enviar mail:Sunsi.Ester@cslbehring.com: si hi ha desviació (FT:2-8°C) indicant : - Producto: - Número de lote: - Número de viales: - Temperatura máxima o mínima alcanzada - Tiempo total fuera del intervalo de la temperatura establecida en la información	CSL Behring
Rimevax®	Virus Xarapió***	Estable durant 1 setmana a + 1°C. Estable	-	-	-	-	Glaxo Smithkline
Risperdal consta®	Risperidona	Estable durant 7 dies a ≤ +25°C	7 dies	7 dies	7 dies a < 25 °C.	7 dies a < 25 °C. Tornar a refrigerar i modificar la caducitat a 7 dies ⁶	Janssen- Cilag
Rixathon®	Rituximab					Fitxa tècnica: Màxim 30 °C durant un únic període de fins a 7 dies, sense sobrepassar la data de caducitat inicial. Una vegada s'ha extret de a nevera no es pot tornar a introduir a la nevera.	Sandoz G mbH
Roactemra®	Tocilizumab	Estable a Tª de congelació de -50°C durant 24 hores. Només estable un cicle de congelació	-	-	-	Vial: Fins 132 hores, Tª max de 30°C. Ploma i xeringa: Fins 141 hores, Tª max de 30°C Una vegada diluïda en SF 0.9% pot estar durant 24 hores a 30°C, seguit de fins a 14 dies a 2-8°C.	Roche Farma
Rocuronio B.Braun EFG®	Rocuronio, bromur	En condicions de conservació de	-	--	-	-	B.Braun Medical
Rocuronio KAB®	Rocuronio, bromur	Estable durant 3	-	-	-	3 mesos a < 30°C.	Fresenius Kabi

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Rotarix ^{®***}	Rotavirus	Conservar entre +2°C i +8°C. No congelar. En cas	-	-	-	-	Glaxo Smithkline
Rotateq ^{®**}	Rotavirus	Conservar entre +2°C i +8°C. No congelar.	-	-	-	-	Sanofi Pasteur MSD
Saflutan [®]	Tafluprost	Conservar entre +2°C i +8°C.	-	-	-	-	Merck Sharp Dohme
Sandostatin [®]	Octreòtid	Estable durant 14 dies a ≤ +30°C. Una cop	14 dies a <30°C	14 dies a < 30 °C	Fins un màxim de 2 setmanes a <	-	Novartis Farmacèutica
Sativex [®]	Cannabidiol, Dronabinol				Consulta laboratori: Si es	Estable 2 anys a +5° C. Estable al menys durant 42 dies a +25° C. El producte es manté inalterat a T ^a = -20°C durant 12 dies.	GW Pharma
Sandostatin [®] LAR	Octreòtid	Estable durant 3 dies a T ^a ambient. Una cop	14 dies a T ^a <30°C	14 dies a < 30 °C	El dia de l'administració es	-	Novartis Farmacèutica
Secrelux [®]	Secretina	Estable durant 3	3 setmanes a 25°C	3 setmanes	-	-	Pharma Internatio
Sendras [®]	Epirubicina	Estable durant 14 dies a	-	-	-	-	Ferrer Farma
Simdax [®]	Levosimendan	48 hores a < 0° C. En cas de formació de partícules, no utilitzar. 48 hores	>25°C: no acceptable 15-25°C: 2-3 dies 8-15°C: 1 setmana 0-2°C: 1 setmana <0°C: 1 setmana Contactar amb el laboratori en	>25°C: no acceptable 15-25°C: 2-3 dies 8-15°C: 1 setmana 0-2°C: 1 setmana <0°C: 1 setmana	2 dies entre 8-15 °C. 1 dia entre 15-25 °C. Rebutjar si > 25 °C. Tornar al refrigerar i mantenir la caducitat ⁶		Abbott Laboratori
Simulect [®]	Basiliximab	Conservar entre +2°C i +8°C. En cas d'incidència	4 dies a <25°C	4 dies a <25° C	Estable durant 24 hores a 25 °C	12h a 22°C. Tornar a refrigerar i mantenir la caducitat ⁶	Novartis Farmacèutica

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Simponi®	Golimumab	Conservar entre +2°C i +8°C	-	-	-	Consultar el laboratori en cas de desviació. Fitxa tècnica: <25 °C durante un único periodo de hasta 30 días. No se debe devolver a la nevera.	Schering Plough/MSD
Soliris®	Eculizumab	-	6-7 dies	-	-	Fitxa tècnica: conservar entre +2°C i +8°C. Estable 3 dies a temperatura ambient solament una única vegada. Un cop transcorregut els 3 dies es pot retornar a la nevera.	Alexion Pharma
Solució cardioplègica del Nido	Solució cardioplègica del Nido	Conservar entre +2°C i +8°C				24h a < 25°C	Braun Medical
Somatulina®	Lanreòtid	Estable durant 3 mesos a Tª	-	-	-	-	Ipsen Pharma
Somatulina	Lanreòtid	Conservar entre +2°C	-	-	-	-	Ipsen Pharma
Somavert®	Pegvisomant	Conservar entre +2°C i +8°C. En cas d'incidència,	-	-	-	-	Pfizer
Stelara®	Ustekinumab	Conservar entre +2°C i +8°C. En cas d'incidència, contactar amb el laboratori que	-	-	-	Vial: Conservar en nevera (no congelar). Vial reconstituït és estable 8 h a 15-25°C. Xeringa precargada: <30°C durante un període màxim de 30 dies i no retornar a la nevera. Laboratori (Juliol 2020): Fora nevera 40h a Tª amb. Tornar a nevera i conservar condicions.	Janssen-Cilag
Streptase®	Estreptoquinasa		Conservar a temperatura ≤ 25°C	Conservar	No s'ha de conservar	-	CSL Behring
Suprefact®	Buserelina, acetat	Conservar a ≤ +25°C.	-	-	-	-	Sanofi Aventis
Suprefact Nasal®	Buserelina, acetat	Conservar entre +2°C i 8°C. Després	-	-	-	-	Sanofi Aventis SA

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Sinacten®	Tetracosàctide	Estable durant un període	3-4h a <25°C	3-4h a < 25°C	Estable durant 3-4	Màxim 3 mesos a < 25°C	<i>Sigma Tau</i>
Sinagis®	Palivizumab	Estable a Tª de congelació n de -20°C fins data de caducitat. L'ús és apte fins 10 mesos	2 setmanes a < 25°C	2 setmanes a < 25°C	4 dies a 25 i 42 °C i amb ús fins 10 mesos.	L'ús és apte fins 10 mesos quan existeix exposició a +25°C durant 4 dies. L'ús és apte fins 10 mesos quan existeix exposició a +42°C durant 4 dies.	<i>Abbott Laboratoris</i>
Sinflorix®**	Streptococcus Pneumoniae Polisacàrid conjugat	Conservar entre +2°C i +8°C. No congelar. En cas d'incidència,	-	-	-	-	<i>Glaxo Smithkline</i>
Sintocinon®	Oxitocina	Estable durant un	3 mesos a <30°C	3 mesos	Menys de 3	3 mesos a < 30°C	<i>Sigma Tau</i>
Somatostatina	Somatostatina					Estable 6 mesos a <25°C (consulta lab)	<i>GP Pharma</i>
Taltz®	Ixekizumab	Conservar entre (2º C - 8º C) 5	Per cada desviació de temperatura cal: (1) Ficar a la nevera tan aviat com sigui possible baix condicions estandard; (2) trucar a - 91 663 50 00 per informar-se de com cal actuar.				<i>Lilly</i>
Technescan Lioma®	Macroagregats Albúmina humana (TC-99M)	Conservar entre +2°C i +8°C.	-	-	-	-	<i>Covidien Spain</i>
Terlipresina®	Terlipresina	-	-	-	-	30h a <25°C y mantener caducidad	<i>Ever Pharmc</i>
Tetract HIB®***	Bordetella pertussis inactivat, Toxoide diftèric, Toxoide tetànic, Haemophilus influenzae B-PRP-T	Conservar entre +2°C i +8°C. No congelar.	-	-	-	-	<i>Sanofi Pasteur MSD</i>
Tevagastri m®	Filgrastim	Conservar entre +2°C i +8°C. En cas d'incidència	-	-	-	-	<i>Teva Pharma</i>

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Tezspire [®]	Tezepelumab	FT: Conservar +2-8°C. Un cop					AstraZeneca
Thyrogeon [®]	Tirotropina alfa	Estable durant 24 mesos a T ^a	1-2 anys	1-2 anys	24 mesos fins 23-27 °C.	1-2 anys a màxim 22-25°C	Genzyme
Timoglobulina [®]	Immunoglobulina de conill antitimocítica humana	Estable durant 12 mesos a T ^a ambient	24 h a < 37°C	24 h a < 37°C	Fins 12 mesos a T ^a ambient.	-	Genzyme
Tioplex [®]	Tiotepa		3 mesos a 25 °C	3 mesos	-	-	Addiene
Tiseel [®]	Adhesiu fibrina	-20°C				-15 i -25 °C (consulta lab)	Baxter
Tissucol [®]	Sistema adhesiu de fibrina de dos components	Conservar a < -18°C. La solució descongelada pot Utilitzar-se en les 48 hores	48 hores. No tornar a congelar	48 hores. No tornar a congelar	Una cop descongelada utilitzar en 48 hores. No tornar a congelar	Una cop descongelada utilitzar en 48 hores. No tornar a congelar	Baxter
Tobi [®]	Tobramicina	Estable durant 28 dies a < -25°C	1 mes a 25°C	1 mes a 25°C	Una cop fora de nevera es pot conservar 28 dies a 25°C	-	Novartis Farmacèutica
Tonocaltin [®]	Calcitonina de salmó	Estable durant 2 mesos entre +20°C i	-	-	-	-	Bama Geve
Torisel [®]	Temsirolimus	Estable durant < 24 hores a ≤ +25°C.	24h a 25°C; Anotar lot, caducitat, T ^a i temps	24 h a 25°C; Anota	24 hores fins 25 °C. Anotar lot, caducitat, T ^a i	24 h a 25°C; Anotar lot, caducitat, T ^a i temps d'exposició i	Pfizer
Tracrium [®]	Atracuri besilat	Es permeten períodes curts fins +30°C pel transport o l'emmagatzemament temporal.			Pèrdua de potència del 8% si s'emgatzema a +30°C durant 1 mes.	Es permeten períodes curts fins +30°C pel transport o l'emmagatzemament temporal. Pèrdua de potència del 8% si s'emgatzema a +30°C durant 1 mes. En cas d'incidència, contactar amb el	Glaxo Smithkline
Tractocile [®]	Atosiban	Estable 24 hores a	24 h a 25°C	24 h a	Màxim 24 hores a 25°C.	24 hores a 25°C	Ferring

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Tremfya	Guselkumab	Fitxa técnica: conservar en nevera 2 a 8°C	-	-	-	Consultar al laboratori en cas de desviació. Laboratori (Juliol 2020): Fora nevera 40h a Tª amb. Tornar a nevera i conservar condicions	Janssen- Cilag
Triaxis® ***	Toxoide tetànic, Toxoid e Diftèric, Antígen de Pertussis	Conservar entre +2°C i +8°C. En cas d'incidènci a.	-	-	-	-	Sanofi Pasteur MSD
Trutest®	Apósito adhesivo para prueba de provocación con alérgenos	FT: Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C).	Consulta laboratori: <48h fora de nevera, no perd estabilitat i es				SMARTPR ACTICE DENMAR K APS
Truxima®	Rituximab	FT: Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C).	Consulta laboratori: Després de fins 12 dies fora nevera, és estable 1 mes a				Kern pharma
Tuberculin a®	Tuberculina	Estable durant 1 setmana a	25 °C: màxim 6 mesos. 35 °C: màxim 2	25 °C: màxim 6 mesos.	25 °C: màxim 6 mesos. 37 °C: màxim	25 °C: màxim 6 mesos. 37 °C: màxim 2 setmanes	UCB Pharma
Tysabri 300®	Natalizumab	Conservar entre +2°C i +8°C	No dades	No dades	-	Consultar el laboratori. Laboratori (Juliol 2020): Fora nevera 40h a Tª amb.	Biogen Idec Iberia
Tyenne ®	Tocilizumab vial	FT: fins 25°C durant 4 setmanes	Consulta laboratori: pot estar fora de la nevera o tornar a guardar-se a				Fresenius Kabi
Tyenne ®	Tocilizumab ploma	FT: fins 25°C durant 14 dies	Consulta laboratori: pot estar fora de la nevera o tornar a guardar-se a				Fresenius Kabi

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Vacuna antigripal Pasteur® ***	Virus gripals inactivats fraccionats	Conservar entre +2°C i +8°C. No congelar. En cas d'incidència	-	-	-	-	Sanofi Pasteur MSD
Vectibix®	Panitumumab	Conservar entre +2°C y +8°C. Estable durant 24 horas a +25°C. No congelar. Estable a -	24h a 25°C	24 h a 25°C	-	24 h a 25°C	Amgen
Veijur®	BCG	Conservar entre +2°C y +8°C.				Conservar entre +2°C y +8°C. No congelar. Màxim 12h a <25°C. Rebutjar si no	Laboratorios Gebro Pharma
Veltassa®	Patiròmer	FT: Conservar entre +2°C y +8°C. Si > 25°C, desinfectar					
Vesiculture®	BCG					Màxim 4h a <25°C. Rebutjar si no compleix. https://ajvaccines.co	
Vespula®	Himenopters (Verí)					Fitxa tècnica: 7 dies màxim a Tª ambient i després retornar a la nevera mantenint caducitat	
Vfend 40 mg/ml 70 mlsuspensió oral	Voriconazol					1 mes a Tª ≤ 25°C, retornar a nevera i mantenir caducitat ⁵	
Viant®	Vitamines932 mg					Si >48 hores a Tª ambient, canviar caducitat a 3 mesos. Si està <48 hores a Tª ambient, es pot retornar a nevera i mantenir	Braun Medical

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Vibrav nosa®	Doxiciclina	Estable 1 mes a Tª ≤ 25°C	-	-	-	-	Pfizer										
Vincristina Ferrer Farma®	Vincristina	Conservar entre +2°C y +8°C. En cas d'incidènci	24h a 25°C	24 h a 25°C	Consultar al laboratorio en cas d'incidència.	Consultar el laboratori	Pfizer										
Viperfav® MSD	Gammaglobuli na antiofidica	No dades	7 dies	7 dies	7 dies a < 25 °C.	-	Sanofi Pasteur										
Vpriv®	velaglucerasa alfa	-	-	-	-	Consulta laboratori: <table><tr><td>Limits Tª</td><td>Duraci máx</td></tr><tr><td>-20°C a <2°C</td><td>6 dies</td></tr><tr><td>2°C a 8°C</td><td>3 anys</td></tr><tr><td>>8°C a ≤27°C</td><td>15 dies</td></tr><tr><td>>27°C a ≤40°</td><td>2 dies</td></tr></table>	Limits Tª	Duraci máx	-20°C a <2°C	6 dies	2°C a 8°C	3 anys	>8°C a ≤27°C	15 dies	>27°C a ≤40°	2 dies	Shire pharmace uticals
Limits Tª	Duraci máx																
-20°C a <2°C	6 dies																
2°C a 8°C	3 anys																
>8°C a ≤27°C	15 dies																
>27°C a ≤40°	2 dies																
Vivaglob in®	Gammaglobuli na humana inespecífica	Estable durante 3 mesos a < +25º C.	3 meses o fins a la data de caducitat si succeeix abans	3 meses o fins a la data	-	-	Csl Behring										
Vygart®	Efgartigimod	2°C to 8°C				Consulta laboratori: <-20°C (-4°F): no usar ≥-20°C (-4°F) i <2°C (36°F) ≤72 h es pot usar amb normalitat. Si >72 hours: no usar. >8° C (46° F) i ≤25° C (77° F) ≤216 h (9 days): es pot usar amb normalitat. Si > >216 hours (9 days): no usar. >25° C (77° F) i ≤30 ° C (86° F) <48 h es	Argenx										
Waylivra ®	Volanesorsen	-	-	-	-	Fitxa tècnica: 6 semanas <30 °C en nevera o Tª ambiente. Después esechar. Laboratori (Juliol 2020): Fora nevera											
Xalatan	Latanoprost	Estable 4	1 mes a 25°C	1 mes	-	-	Pfizer										
Xalacom ®	Latanoprost Timolol	Estable 4 setmanes	1 mes a 25°C	1 mes a	-	-	Pfizer										

	CONTROL I REGISTRE DE TEMPERATURA DE FRIGORÍFICS QUE CONTINGUIN MEDICACIÓ TERMOLÀBIL A L'ÀREA DE CRÍTICS	Cod: DI-MIV-PNT-1340
		Versió: 1a
		1ra versió: desembre - 2024
		Versió vigent: desembre - 2024

Xolair®	Omalizumab	Conservar entre +2°C i +8°C. En cas d'incidència, contactar amb el	Anotar lot, caducitat, Tª i temps d'exposició i contactar amb laboratori.	Anotar lot, caducitat, Tª i temps d'exposició i contactar amb laboratori.	5 dies a Tª ambient	12h a 22°. Tornar a refrigerar i mantenir la caducitat ⁶ . Consultar el laboratori. Fitxa tècnica: Estable durant 4 h >25°C. Retornar a la	Novartis Farmacèutica
Yuflyma®	Adalimumab					Consultar el laboratori. Estable 12 mesos a 4-8°C després d'estar 12 dies entre -20°C i 40°C ⁶ Fitxa tècnica: Conservar a <25 °C	Celltrion Healthcare Hungary
Zarzio®	Filgrastim	Conservar entre +2°C i +8°C. En cas d'incidència	-	-	-	Fitxa tècnica: 72 h a <25°C en un únic període. No es pot retornar a la nevera però només es pot	Sandoz Farmacèutica
Zerbaxa®	Ceftolozano/tazobactam	-	-	-	-	10 dies a temperatura <25°C. Tornar a refrigerar i mantenir la	
Zomacto	Somatropina	Estable 24	24-48 h	24-48	24-48 hores a	-	Ferring
Zutectra®	Immunoglobulina antihepatitis B SC					50h a temperatura ≤ 30°C. Tornar a refrigerar i mantenir la caducitat ⁶ .	Biotest